

# SINARAÑITA (SC)®

*Bacillus thuringiensis var. thuringiensis*

INOCULANTE BIOLÓGICO



## COMPOSICIÓN

*Bacillus thuringiensis var. thuringiensis*  
Excipientes

2.5 x 10<sup>9</sup> UFC/gr.  
4 L.

*BioSolution Center*

Jr. Leonisa Lescano 609, Huaraz-Perú  
Telef. +51 94262922  
correo: incoodesa@gmail.com

Instituto de cooperación para el  
desarrollo agropecuario

## RECOMENDACIONES DE USO

- *Bacillus thuringiensis var. thuringiensis* es un eficiente entomopatógeno natural de ácaros y arañas rojas.
- Actúa por contacto e ingestión provocando la muerte de los adultos e inmaduros de ácaros y arañas rojas que afectan a los diversos cultivos.
- Cuando se hace una mezcla (insecticidas, fertilizantes, etc.) para aplicar el producto diluido en agua no debe estar más de 24 horas sin aplicarlo.
- Se aplica vía foliar usando un adherente el cual es indispensable con el uso del producto.
- Se debe aplicar como un producto de contacto, esto significa que debe ser aplicado sobre la plaga (cuando hay presencia de la plaga)
- Cuando se aplica, se debe aplicar preferiblemente en horas de la tarde, después de las 4:00 PM.

## DOSIS

- La dosis recomendada es de 1 a 2 litros por cilindro con agua de 200 litros.
- Usar un corrector de pH. El pH debe ser ácido de preferencia 6.8 . Utilizar adherente.

## FITOTOXICIDAD

- No es fitotóxico.

## PROTECCIÓN DE USO

- Usar mascarilla, guantes, botas y ropa de protección para su preparación y aplicación.
- Evite la inhalación o contacto directo del producto. Bañarse después de la aplicación, lavar la indumentaria con que realizó la aplicación.
- No comer, ni fumar durante la aplicación.
- Almacenar en un lugar seguro fuera del alcance de los niños

## COMPATIBILIDAD

- Es compatible con cualquier producto biológico.
- Incompatibilidad con productos alcalinos.